

REFERENCES

- BECK—MANNAGETTA (1916): Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka.—Glasn. zemal. Muz., Sarajevo, 28: 41—168.
- BOISSIER E. (1842): Diagnoses plantarum orientalium novarum vol. 1, no. 1.—Genevae.
- (1867): Flora orientalis sive enumeratio plantarum in oriente a Graeca et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatorum tom. 1.—Basileae et Genevae.
- BORBÁS V. (1902—1903): Hazánk meg a Balkán *Hesperis*-egyészintendö.—Magy. Bot. Lap., Budapest, 1: 161—167, 196—204, 229—237, 261—272, 304—313, 344—348 et 369—380; 2: 12—23.
- BORNMÜLLER J. (1936): Symbolae ad Floram Anatolicam. — FEDDE's Repert. Beih., Dahlem bei Berlin, 89 (1): 1—64.
- DVOŘÁK F. (in the press): *Hesperis glutinosa* Vis. $2n = 14$.
- FIORI A. (1923—1925): Nuova flora analitica d'Italia tom. 1.—Firenze.
- FOURNIER M. E. (1866): Monographie du genre *Hesperis*.—Bull. Soc. bot. France, Paris, 13: 326—361.
- HAYEK A. (1927): Prodrömus flöae peninsulae Balcanicae.—FEDDE's Repert. Beih., Dahlem bei Berlin, 30 (1): 1—1193.
- JANCHEN E. (1919): Beitrag zur Floristik von Ost-Montenegro.—Oest.bot.Z., Wien, 68: 166—179.
- MORTON F. (1916): Beiträge zur Kenntnis der Flora von Süddalmatien.—Oest. bot. Z., Wien, 66: 263—266.
- SCHLOSSER-KLEKOVSKI J. C. et VUKOTINOVIĆ-FARKAŠ L. (1869): Flora croatica exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas quae in Croatia, Slavonia et Dalmatia sponte crescunt nec non illas quae frequentissime coluntur.—Zagrebiae.
- STOJANOV N. et STEFANOV B. (1933): Flora na Balgarija.—Sofija.
- STROBL G. (1872): Aus der Fröhlings-Flora und Fauna Illyriens.—Verh. zool.—bot. Ges., Wien, 22: 577—616.
- TZVELEV N. N. (1959): Rod *Hesperis* v SSSR.—Bot. Mat. Gerb. Inst., Moskva et Leningrad, 19: 114—155.
- VELENOVSKÝ J. (1898): Flora bulgarica suppl. 1.—Pragae.
- VISIANI R. (1852): Flora dalmatica sive enumeratio stirpium vascularum quas HACTENUS in Dalmatia lectas et sibi observatas descripsit digessit rariorumque iconibus illustravit tom. 3. — Lipsiae.