

LITERATURA

- ANGELIN, N. P., 1878: *Iconographia crinoideorum in stratis Sueciae siluricis fossilium*. Opus postumum edendum curavit Regia Academia Scientiarum Suecia. Holmiae. Pp. 1–62, pls. 1–29.
- BASSLER, R. S.—MOODEY, M. W., 1943: Bibliographic and faunal index of Paleozoic pelmatozoan echinoderms. Geol. Soc. Amer., Spec. Pap. 45. Baltimore, pp. I–VI, 1–733.
- BATHER, F. A., 1893: The Crinoidea of Gotland, Svenska Vetensk. Akad. Hundl., Bd. 25, no. 2, p. 1–200, pls. 1–10.
- BEYER, A. K., 1951: Zur Stratigraphie des obersten Gotlandiums in Mitteleuropa. Wissensch. Zeitsch. der Univ. Greifswald, Jahrg. I, 1951/52. Mitteil. Geol. Pal. Inst. Univ. Greifswald, N. F., Nr. 14.
- BOUČEK, B., 1931: O některých nových bohatých nalezištích zkamenělin ve starším paleozoiku středních Čech. Věda přírodní, roč. XII, Praha.
- 1934: Bemerkungen zur Stratigraphie des böhmischen Gotlandien und seinen Faziesverhältnissen. — Zbl. f. Min. usw., Jg. 1934, B. Stuttgart.
- 1936: La stratigraphie du Silurien dans la vallée de Daleje près de Prague et dans son voisinage immédiat. Bull. international de l'Académie des Sciences de Bohême, XLVI/27.
- 1941: O novém odkryvu siluru u Lodenic. Zprávy Geol. ústavu, XVII, 165–171, Praha.
- BOUŠKA J., 1943: Rod Gissocrinus Ang. a jeho druhy v českém siluru. Rozpr. II. tř. České akademie, roč. LIII, č. 44.
- 1947: Pygmaecrinus, new crinoid from the Devonian of Bohemia. Věst. Král. čes. spol. nauk, roč. 1946, č. II.
- CLOUD, P. E., 1952: Facies relationships of organic reefs. Bull. Amer. Ass. Petr. Geol., Vol. 36, No. 11.
- ETHRIDGE, R.—CARPENTER, P. H., 1881: Contributions to the study of the British Paleozoic Crinoids, No. I. On Allagecrinus, a new genus. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 7.
- ETHRIDGE, R., Jun., 1904: The Occurrence of Pisocrinus or an Allied genus in the Upper Silurian Rocks of the Yass District. Rec. Australian Mus., 5, No. 5, p. 289–292, P. XXXVII.
- FOLLMANN, O., 1887: Unterdevonische Crinoiden. Verh. naturhist. Ver. preußischen Rheinl. etc., 44. p. 113–138, pls. 2–3. Bonn.
- HANUŠ, F., 1927: Právý poklad zůstatků devonské zvířeny u Prahy. Čas. Nár. musea, roč. CI (51), sv. III, str. 89 až 96. Praha.
- 1923: Moje sbírka zkamenělin z českého Barrandienu. Čas. Nár. musea, roč. XCVII, sv. 2–3, str. 83.
- HEDE, J. E., 1942: On the correlation of the Silurian of Gotland. Lunds. Geol. Fältkl. 1892–1942. Lund. Pp. 205–229.
- HORNÝ, R., 1954: Studie o faciálním a biostratigrafickém vývoji vrstev budňanských v záp. části Barrandienu. Sb. ÚÚG XXI, 1954, Praha 1955.
- CHLUPÁČ, I., 1953: Stratigraphical Investigation of the Border Strata of the Silurian and the Devonian in Central Bohemia. Sborník ÚÚG, sv. XX.
- JAEKEL, O., 1895: Beiträge zur Kenntnis der paläozoischen Crinoiden Deutschlands. Paleontol. Abh., 7., Heft 1. Pl. 1–10.
- 1900: Über einen neuen Pentacrinoideen — Typus aus dem Obersilur. Zeitschr. Deutsch. Geol. Gessell. 52, p. 480.
- 1918: Phylogenie und System der Pelmatozoen. Paleontol. Z. 3. Pp. 1–128.
- KIRK, E., 1914: Note on the fossil crinoid genus Homocrinus Hall. Proc. U. S. Nat. Mus., 46, Nr. 2038, p. 473–483, Pl. 42. Washington.
- KODYM, O.—BOUČEK, B.—ŠULC, J., 1931: Guide to the geological excursion to the neighbourhood of Beroun, Koněprusy and Budňany. Knih. St. geol. ú., sv. 15, Praha.
- KONINCK DE, L. G., 1858: Sur quelques crinoides paléozoïques nouveaux de l'Angleterre et l'Ecosse, Acad. roy. Belgique, Bull., sér. 2, vol. 4, p. 93–108, pl. 2.
- MILLER, S. A., 1892: Paleontology. 17th. Rep. Geol. Surv. Ind., p. 611–705, pls. 1–20.
- MILLER, S. A.—GURLEY, W. F. E., 1895: New and interesting species of Pal. fossils, Ill. St. Mus. Nat. Hist., Bull. 6, p. 1–62, pls. 1–5.
- MOORE, R. C.—LAUDON, L. R., 1941: Symbols for crinoid parts. Journal of Pal. 15. Menasha, Wisc. Pp. 412–423.
- 1943: Evolution and classification of Paleozoic crinoids. Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 46. Baltimore. Pp. I–X, 1–153, Pls. 1–14.
- 1944: Class Crinoidea, pp. 137–209, pls. 52–79 in H. W. SHIMMER and R. R. SHROCK, 1944, Index fossils of North America.
- MOORE, R. C.—PLUMMER, F. B., 1940: Crinoids from the Upper Carboniferous and Permian strata in Texas, Univ. Texas, Bull. 3945, p. 1–468, pls. 21.

- MÜLLER, JOH., 1857: Über neue Echinodermen des Eifler Kalkes. Abh. k. preuss. Akad. Wiss. Berlin, phys.-matem. Kl. f. 1856, S. 243–268. Taf. 1–4.
- MÜNSTER, G., 1839: Beiträge zur Petrefactenkunde. H. 1. Bayereuth 1839.
- NORTHROP, S. A., 1939: Paleontology and Stratigraphy of the Silurian Rocks of the Port Daniel-Black Cape region, Gaspé. Geol. Soc. Amer., Spes. Pap. 21, Baltimore, pl. 1–28.
- OEHLERT, D. P., 1882: Crinoides nouveaux du Dévonien. Bul. Soc. Géol. de France, (3) 10, pp. 352–363, pls. 8, 9.
- PRANTL, F., 1942: Zkameněliny českých pramoří, jejich sběr a určování. Vesmír, Praha.
- PRANTL, F.—PŘIBYL, A., 1948: Revise různorodých (Eurypterida) z českého siluru. Rozpr. SGÚ, sv. X, Praha.
- QUENSTEDT, F. A., 1876: Petrefactenkunde Deutschlands, Abt. 1, Bd. 4, p. 1–742, pls. 90–114, Leipzig.
- RAMSBOTTOM, W. H. C., 1950: A new Species of Lyriocrinus from the Wenlock Limestone. Ann. and Mag. Nat. Hist., Ser. 12, vol. III, p. 651. August 1950.
- REGNÉLL, G., 1948: An Outline of the Succession and Migration of Non-Crinoid Pelmatozoan Faunas in the Lower Paleozoic of Scandinavia. Arkiv f. Kemi etc., K. Svenska Vetenskapsakademien. Band 26 A. No. 13. Stockholm.
- RICHTER, R., 1943: Einführung in die zoologische Nomenclatur durch Erläuterung der Internationalen Regeln. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Frankfurt a. M., p. 1–154.
- ROWLEY, R. R., 1904: American Geologist, 34, p. 269, pl. 16.
- RŮŽIČKA, B., 1941: Faunistické seznamy z Barrandienu ze souvrství g a (část II.) a ze dvou lokalit z g γ v okolí pražském. Věst. Král. čes. spol. nauk, roč. 1941.
- RŮŽIČKA, B.—BOUŠKA, J., 1944: Zkameněliny z českého siluru z lomů „Amerika“ u Velké Mořiny. Věda přírodní, roč. 22, č. 7. Praha, březen 1944.
- SCHMIDT, W. E., 1930: Die Echinodermen des deutschen Unterkarbons. Abh. d. Preuss. Geol. Landesanstalt, N. F., H. 122. Berlin.
- 1934: Die Crinoideen des Rheinischen Devons. I. T.: Die Crinoideen des Hunsrückschiefers. Abh. preuss. geol. L. A., N. F., 163. Berlin, pls. 1–34, Pp. 1–149.
- 1941: Die Crinoideen des Rheinischen Devons. II. T.: A. Nachtrag zu: Die Cr. d. Huns. B. Die Crinoideen des Unterdevons bis zur Cultrijugatus-Zone. Reichstelle f. Bodenforschung. N. F. 182. Pls. 1–26. Pp. 1–253.
- SCHULTZE, L., 1866: Monographie der Echinodermen des Eifler Kalkes, Kais. Akad. Wiss., Math.-Naturw. Kl., Denkschr., vol. 26, pt. 2, p. 113–230, pls. 1–13. 1867.
- SOLLAS, W. J., 1900: Fossils in the Oxford University Museum, II, On two new genera and species of crinoidea (Brahmacrinus panderosus and Cicerocrinus elegans), London Geol. Soc., Quart. Jour., vol. 56, p. 264–272, pl. 16, textfigs. 1–4.
- SPRINGER, F., 1926: American Silurian Crinoids. Smithsonian Inst., Publ. 2871, p. 1–239, pls. 1–33.
- STRIMPLE, H. L.: Some new species of crinoids from the Henryhouse formation of Oklahoma. Jour. Wash. Ac. Sci., Vol. 42, No. 3.
- SVOBODA, J.—PRANTL, F., 1949: Stratigraficko-tektonická studie o devonské oblasti koněpruské. Zvl. otisk ze Sborníku SGÚ, sv. XVI, Praha.
- SWARTZ, CH. K., et al., 1942: Correlation of the Silurian formations of North America. Bull. Geol. Soc. Amer. 53. Ndw York, Pp. 533–538. 1 pl.
- TERMIER, G. et H., 1950: Invertébrés de l'Ere Primaire. (Paléont. Marocaine, T. II, fasc. IV, pp. 1–279, pls. CLXXXIV–CCXLI.)
- WACHSMUTH, C.—SPRINGER, F., 1886: Revision of Paleocrinoidea, pt. 3, sec. 2, Philadelphia Acad. Nat. Sci.
- WANNER, JOH., 1916: Die Permischen Echinodermen von Timor, I Teil., Paläontologie von Timor, Lief. 6, Teil 11, p. 1–329, pls. 96–114 (1–19), text figs. 1–88.
- WELLER, J. W., 1930: A group of Larviform Crinoids from Lower Pennsylvanian strata of the Eastern Interior Basin. Ill. Geol. Surv., Rep. Invest., no. 21, p. 1–38, pls. 1–2.
- WELLER, S., 1900: The paleontology of the Niagaran limestone in the Chicago area. The Crinoidea, Chicago Acad. Sci., Bull. 4, p. 9–153, pls. 1–15, text figs. 1–57.
- WOOD, E., 1909: A critical summary of Troost's unpublished manuscript on the crinoids of Tennessee, U. S. Nat. Museum, Bull. 64, p. 1–150, pls. 1–15.
- YAKOVLEV, N. N., 1946: Un Hexacrinide du Silurien supérieur. Comptes Rendus (Doklady) de l'Académie des Sciences de l'URSS, Vol. LI, No 2.
- 1947a: Jaekelicrinus gen. nov. — Nedostavavšij člen filetičeskogo rjada Pisocrinidae. Comptes rendus de l'Académie des Sciences de l'URSS. Note tirée a part du vol. LVII, N. 6.
- 1947b: Izmenija skeletnyh častej morskich lilij vsledsvije mehaničeskich faktorov. Doklady Akademii Nauk SSSR. Novaja serija. Ottisk iz. T. LVI, No. 7.
- ZITTEL, K. A., 1879: Handbuch der Paläontologie, Bd. I, Paläozoologie, Abt. 1, München, p. 308–350.