
Inhalt

Vorwort	VII
Bachmann, W. (Kronach); Lotz, N.; Sieger, C. (München): Kombination Insulin/Sulfonylharnstoffe – ein neuer Beginn?	1
<i>Klinisch-experimentelle Untersuchungen</i>	
Klujko, J.; Schmidt, F. H.; Kühnle, H. F. (Mannheim); Reiter, J.: Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus der kombinierten Gabe von Glibenclamid und Insulin bei Typ-II-Diabetikern mit Sekundärversagen auf die orale Behandlung	13
Hasche, H. (Rotenburg/Wümme): Kombinationsbehandlung mit unterschiedlichen Glibenclamiddosen. Eine Doppelblindstudie an 36 Sekundärversagern	26
Schwarz, O. (Mannheim); Rosak, C.; Althoff, P. H.; Schöffling, K. (Frankfurt/M.); Schmidt, F. H. (Mannheim): Kombinierte Behandlung von Typ-II-Diabetikern mit Insulin und Glibenclamid nach Tablettensekundärversagen. Doppelblinde, Insulin-Placebo-kontrollierte Cross-over-Studie .	35
Stahl, T. (Freudenberg): Kombination von Normalinsulin plus Glibenclamid bei Sekundärversagern	47
Henrichs, H. R. (Quakenbrück): Sulfonylharnstoff/Insulin-Kombination bei Diabetes mellitus nach Tablettensekundärversagen. Ergebnisse einer Doppelblind-Glibenclamid-Cross-over-Studie	54
Willms, B.; Boustani, A. (Lauterberg): Vergleich von präprandialer Altinsulingabe mit NPH-Insulingabe vor dem Schlafengehen und konventioneller Insulintherapie bei der Kombinationstherapie Insulin/Sulfonylharnstoffe bei Typ-II-Diabetes	71
Bottermann, P. (München): Insulinbehandlung bei Typ-II-Diabetes bei Sekundärversagen einer Sulfonylharnstoff-Therapie. Diskussionsbeitrag	81
Bergis, K. H. (Bad Mergentheim): Nachts Insulin – tags Sulfonylharnstoffe: der praktikable Kompromiß zur Insulinersteinstellung bei Typ-II-Diabetikern im SH-Sekundärversagen	88

Langzeitstudien

Knick, B.; Röckel, A.; Panitz, N.; Groth, U. (Wiesbaden): Vergleichsstudie zwischen Sulfonylharnstoff/Insulin (mit spezieller Berücksichtigung eines Kollektivs niereninsuffizienter Patienten) und Metformin-Insulin-Kombinationstherapie bei Typ-II-Diabetes	98
Sachse, G.; Mäser, E.; Federlin, K. (Gießen): Langzeitergebnisse der Kombinationstherapie Insulin/Sulfonylharnstoff: Ergebnisse, Kritik, klinische Konsequenzen	107
Bachmann, W. (Kronach); Lotz, N.; Mehnert, H. (München); Rosak, C.; Schöffling, K. (Frankfurt/M.): Kontrollierte, multizentrische, doppelblinde klinische Prüfung zur Wirksamkeit der Kombinationsbehandlung	113
Stürmer, W. (Würzburg); Schrezenmeir, J. (Mainz); Kasper, H. (Würzburg): Langzeitergebnisse der kombinierten Sulfonylharnstoff/Insulin-Therapie bei Patienten mit positivem Glibenclamidtest unter Clamp-Bedingungen	126
Lotz, N.; Bachmann, W.; Mehnert, H.: Die Kombination von Sulfonylharnstoff und Insulin in der Langzeittherapie des «Sekundärversagens» bei Typ-II-Diabetes	137
Petzold, R.; Klein, E. (Bad Oeynhausen): Insulin/Sulfonylharnstoff-Therapie bei «Sekundärversagen» – klinische Beobachtungen	153
Klein, W. (Berlin): Kombinationsbehandlung Sulfonylharnstoff/Insulin bei Sekundärversagen. Langzeitbeobachtungen bei mehrfacher stationärer Behandlung (Diskussionsbeitrag)	159
Bachmann, W. (Kronach); Lotz, N.; Mehnert, H. (München): Schlußbetrachtungen	162