

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>1.</b> | <b>Úvod</b>  | <b>3</b> |
| <b>2.</b> | <b>Cíl metodiky</b>  | <b>3</b> |
| <b>3.</b> | <b>Vlastní popis funkčního vzorku</b>  | <b>4</b> |
| 3.1.      | Příprava atenuovaných kmenů <i>S. Enteritidis</i> , <i>S. Typhimurium</i> a <i>S. Infantis</i>       | 4        |
| 3.2.      | Perzistence jednotlivých kmenů trivalentní vakcíny ve slepém střevě a játrech<br>imunizovaných kuřat | 4        |
| 3.3.      | Test pasivní chráněnosti   | 5        |
| 3.4.      | Stimulace specifické imunitní odpovědi   | 6        |
| <b>4.</b> | <b>Srovnání „novosti postupů“</b>  | <b>7</b> |
| <b>5.</b> | <b>Uplatnění funkčního vzorku</b>  | <b>7</b> |
| <b>6.</b> | <b>Ekonomické aspekty</b>  | <b>7</b> |
| <b>7.</b> | <b>Seznam použité související literatury</b>   | <b>8</b> |
| <b>8.</b> | <b>Dedikace</b>  | <b>8</b> |