

OBSAH

In memoriam – Profesor Karel Benda	4
Časné použití přístroje PhysioTouch® ve dvoufázové léčbě lymfedému horní končetiny u pacientky s karcinomem prsu	6
Léčba maligního lymfedému	7
U maligního lymfedému jsou přínosem všechny složky komplexní dekongesční fyzioterapie i bez použití manuální lymfatické drenáže	8
Samostatné měření lymfedému pomocí bioelektrické impedance zlepšuje dodržování domácí léčby	10
Antiangiogenní a prolymfangiogenní přípravky by mohly nalézt uplatnění v léčbě chronických zánětlivých onemocnění	13
Podpora lymfangiogeneze může být přínosem v léčbě astmatu a jiných zánětů dýchacích cest	14
Fluorescenční lymfografie	15
Stewart-Trevesův syndrom 7 let po mastektomii – kazuistika 79leté pacientky	16
Manuální lymfodrenáž může zmírnit otok tváře po odstranění neprořezaného zubu moudrosti	17
Poškození lymfatické a žilní drenáže se při chronickém posttraumatickém otoku dolních končetin uplatňuje jen vzácně	18
SPECT/CT zpřesňuje diagnostiku primárního lymfedému dolních končetin	19
V cévách dolních končetin byly prokázány kryptické (spící) bakterie	20
Intenzivní kombinovaná ambulantní 4týdenní léčba lymfedému	21
Topické podání tacrolimu významně zmírnilo lymfedém u experimentálního modelu	22
Kompresní systémy Lympha Press	23
Osteoartróza a lymfedém?	25
Léčba závažného pooperačního edému horní končetiny s otevřenou ránou – kazuistika	26