

Obsah

1	Úvod	5
2	Význam a funkce travních porostů	6
3	Charakteristika stanoviště Kameničky	9
4	Třísečně využívané porosty	16
4.1	Produkce sušiny píce	17
4.1.1	Vliv odstupňovaných dávek hnojiv	17
4.1.2	Produkční účinnost dodaných živin	18
4.1.3	Vliv ročníku	19
4.1.4	Podíl jednotlivých sečí	22
4.2	Agrobotanická skupina trav	23
4.3	Agrobotanická skupina ostatních bylin	30
4.4	Agrobotanická skupina jetelovin	35
4.5	Hodnocení druhové diverzity a druhové pestrosti	37
4.6	Vliv povětrnostních podmínek na zastoupení dominantních druhů	44
5	Dvousečně využívané porosty	46
5.1	Produkce sušiny píce	46
5.1.1	Vliv odstupňovaných dávek hnojiv	46
5.1.2	Produkční účinnost dodaných živin	47
5.1.3	Vliv ročníku	48
5.1.4	Podíl jednotlivých sečí	51
5.2	Agrobotanická skupina trav	52
5.3	Agrobotanická skupina ostatních bylin	58
5.4	Agrobotanická skupina jetelovin	62
5.5	Hodnocení druhové diverzity a druhové pestrosti	64
5.6	Vliv povětrnostních podmínek na zastoupení dominantních druhů	68
6	Porovnání produkce píce při různé intenzitě využití	70
7	Porovnání dvousečného a třísečného travního porostu	71
7.1	Druhová skladba	71
7.2	Druhová diverzita	73
7.3	Vliv povětrnostních podmínek na druhovou diverzitu a druhovou pestrost	75
8	ZÁVĚR	78
8.1	Třísečně využívané porosty	78
8.2	Dvousečně využívané porosty	79
9	SEZNAM LITERATURY	82