

Inhalt

Originalarbeiten

- JOHAN ALMKVIST, Stockholm. Das Quecksilber in den vorgriechischen Kulturen. S. 1139.
L. ARZT, Wien. Zum klinischen Erscheinungsbild der Lymphogranulomatose der Haut.
Mit 1 Abbildung im Text. S. 1145.
PEDRO L. BALIÑA y LUIS DE MARVAL, Buenos Aires. Sobre un caso de Eritrodermia
y Leucemia linfatica aguda. Con 8 figuras. S. 1150.
HOULOUSSI BEHDJET, Stambul. Ein fortgeschrittener, Skrophuloderma imitierender Asper-
gillusfall mit gummosen Ulzerationen. Mit 6 Abbildungen im Text. S. 1157.
B. BERON, Sofia. Beitrag zur Klinik der postpsoriatischen Depigmentationen. Mit 5 Ab-
bildungen im Text. S. 1161.
BRUNO BLOCH, Zürich. Zum Begriff und Wesen der Präkankerose. Mit 5 Abbildungen
im Text. S. 1164.
HARALD BOAS, Kopenhagen. Ausgedehnte infektiöse Gangrän der Haut auf arterio-
sklerotisch-diabetischer Basis. Mit 2 Abbildungen im Text. S. 1171.
P. L. BOSELLINI, Roma. Sul morbo di BOWEN e similari. Con 2 figuras. S. 1173.
C. BRUHNS u. A. ALEXANDER, Charlottenburg. Mykologische Beiträge I. S. 1179.
E. BRUUSGAARD, Oslo. Zwei Fälle von ausgebreittem Herpes simplex, davon einer mit
retrobulbärer Neuritis. S. 1183.
J. S. COVISA y J. GAY PRIETO, Madrid. Contribucion al estudio de la urticaria al frio.
S. 1188.
J. DARIER, Paris. Eczéma artificiel „en coulée“. Avec 2 fig. dans le texte. S. 1192.
GJ. GJORGJEVIĆ, Belgrad. Über Prurigo. S. 1195.
C. KREIBICH, Prag. Zur indirekten Röntgenbehandlung des Ekzems. S. 1198.
F. KRZYSZTALOWICZ, Warschau. Über die Ekzemfrage. S. 1201.
E. GRAHAM LITTLE, London. An Undescribed Variety of Lichen Planus. S. 1203.
S. MENDES DA COSTA u. G. CREMER, Amsterdam. Kaviarähnliche Körner unter der Zunge.
Mit 2 Abbildungen im Text. S. 1206.
L. NÉKÁM, Budapest. Einige Handgriffe und kleinere Apparate im Dienste der Dermato-
logie. Mit 6 Abbildungen im Text. S. 1209.
S. NICOLAU u. TH. STEFANESCOU, Bucarest. Contribution à l'étude de la radiothérapie
indirecte dans le lichen plan. S. 1212.

(Fortsetzung des Inhalts auf Seite X)

Dr. Ritsert's

Anaestheform-Vaselin

(10% dijodphenolsulfosaures Anaesthesin)

schmerzstillend wundreinigend
epithelisierend

Sehr gut bewährt
bei: **Röntgengeschwüren –**
chronischen Ulcera – Mal perforant
bei Behandlung **schmerzhafter und juckenerregender**
Dermatosen

LITERATUR: Dr. K. Fürst aus der Universitäts-Hautklinik, Frank-
furt a. M. (Direktor Geh. Rat K. Herxheimer) D. Med. W. 21
von 1926. Dr. Freischmidt, Derm. W. Nr. 25 v. 1930

Dr. Ritsert, Frankfurt a. M.